



STINAPA INFORMEERT

DE VERLEIDINGSDANS VAN DE FLAMINGO

De salina's van Slagbaai, het Gotomeer en het Pekelmeer zijn belangrijke voedselgebieden van de flamingo's. Het zijn ook gebieden waar ze nestelen en broeden. Voordat de vogels gaan paren, proberen ze elkaar te verleiden met een dans. Deze verleidingdans heet 'baltsen'. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes doen eraan mee. Het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes is alleen zichtbaar aan hun lengte. Mannetjes zijn ongeveer twintig centimeter groter. De balts begint in een groep flamingo's met het strekken van de nek en het eventjes spreiden van de vleugels. De zwarte veren van de vleugels zijn dan goed zichtbaar. Ook het gladstrijken van de veren of de snavel op de rug leggen zijn bewegingen die bij de balts horen. Na een tijdje vliegen de vogels een stukje als onderdeel van de dans. Nu schudden de flamingo's ook met hun kop en maken buigingen met licht gespreide vleugels. Ze gakken als ganzen of maken het bekende 'chogogo' geluid. Op die manier worden de paartjes gevormd. De paartjes scheiden zich vervolgens af van de groep waardoor die steeds kleiner wordt. Vanaf dit moment blijven het mannetje en vrouwtje bij elkaar, ze zoeken samen naar voedsel en ze slapen samen. Het paren begint ongeveer vier weken voordat het ei wordt gelegd. De paring begint meestal wanneer het vrouwtje voedsel loopt te zoeken met het hoofd of de snavel onder water. Het mannetje loopt van achteren op haar toe totdat zijn borst haar staart raakt. Het vrouwtje blijft staan en spreidt de vleugels. Het mannetje bestijgt het vrouwtje met zijn voeten onder haar vleugels. Hij flappert met zijn vleugels om zijn evenwicht te kunnen bewaren en hangt naar achteren. Het vrouwtje houdt vaak haar kop onder water. De bevruchting vindt plaats via een uitstulping aan het onderlichaam van beide vogels, de cloaca. Die uitstulping bevat naast de organen voor de afscheiding van de ontlasting en de urine ook de geslachtsorganen. Zo bereiken de spermacellen van het mannetje de eileiders van het vrouwtje. Wanneer de vogels eenmaal hebben gepaard, legt het vrouwtje één flink ei. Het nest heeft een kegelvorm met een doorsnede van dertig centimeter. Het is opgebouwd uit modder en steentjes. Na ongeveer dertig dagen broeden komt het ei uit. De ouders voeren hun grijswitte donsjong met een rode voedzame vloeistof afkomstig uit hun voormaag. Na enkele weken gaat het kuiken naar de crèche. Deze kinderbewaarplaats wordt bewaakt door enkele volwassen flamingo's. De ouders blijven hun eigen jong voeren, totdat het na drie maanden een volgroeide filtersnavel heeft.

Geschreven door V. van Baronie

Wilt u reageren of meer informatie: STINAPA telefoon: 717- 8444, info@stinapa.org

NOS TA BIBA DI NATURALESA



Traha huntu na un desaroyo duradero pa Boneiru